


定期予防接種の種類と接種時期

▼BCG・ロタ・B型肝炎・ヒブ・小児用肺炎球菌・4種混合・2種混合・麻しん風しん・水痘・日本脳炎・子宮頸がん予防

乳幼児期に受ける予防接種については、生後6週頃に予防接種券・予診票を一括してお送りします。
麻しん風しん2期、2種混合、日本脳炎2期については、対象年齢に個別通知します。

※予防接種予診票をお持ちでない方は、母子健康手帳を持参して、健康増進課にお越しください。
予防接種の接種状況を確認させていただいた後、予診票をお渡します。



予防接種名	対象年齢	接種回数	標準的な接種時期	
BCG	生後2か月～1歳に至るまで	1回	生後5か月～8か月に達するまで	
ロタ	ロタリックス (1価)	生後6週に至った日の翌日から24週に至る日の翌日まで	2回	初回接種: 生後2か月～14週6日後まで 接種間隔は27日以上あける *いずれか同一のワクチンで接種を完了してください。
	ロタテック (5価)	生後6週に至った日の翌日から32週に至る日の翌日まで	3回	
B型肝炎	生後2か月～1歳に至るまで	3回	生後2か月～9か月に至るまで	
	1・2回目: 27日以上の間隔をおいて2回	(2回)		
	3回目: 1回目から139日以上の間隔をおいて1回	(1回)		
ヒブワクチン	生後2か月～60か月に至るまで	4回	* 接種開始月齢により接種回数が異なります。	
	初回 27日～56日までの間隔をおいて3回	(3回)	接種開始: 生後2か月～7か月に至るまで (生後12か月までに3回完了する)	
	追加 初回終了後、7か月～13か月の間に1回	(1回)		
小児用肺炎球菌ワクチン	生後2か月～60か月に至るまで	4回	* 接種開始月齢により接種回数が異なります。	
	初回 27日以上の間隔をおいて3回	(3回)	接種開始: 生後2か月～7か月に至るまで (生後12か月までに3回完了する)	
	追加 生後12か月以降に初回終了後、 60日以上おいて1回	(1回)	生後12か月～15か月に至るまで	
4種混合 ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ	1期: 生後3か月～90か月に至るまで	4回		
	初回 20日～56日までの間隔をおいて3回	(3回)	生後3か月～12か月に達するまで 	
	追加 初回終了後6か月以上おいて1回	(1回)	初回終了後12か月～18か月までの間隔をおく	
2種混合 ジフテリア 破傷風	2期: 11歳～13歳未満	1回	小学6年生 (平成22年4月2日～平成23年4月1日生まれ)	
麻しん風しん	1期: 生後12か月～24か月に至るまで	1回	1歳	
	2期: 5歳～7歳未満 (小学校就学前の1年間)	1回	年長児 (平成28年4月2日～平成29年4月1日生まれ)	
水痘	生後12か月～36か月に至るまで	2回	初回: 生後12か月～15か月に至るまで 追加: 初回終了後6か月～12か月に至るまで	
日本脳炎	1期: 生後36か月～90か月に至るまで	3回	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px;"> 日本脳炎予防接種の積極的勧奨の差し控えにより、接種機会を逃した方につきましては、不足分を特例措置として接種できます。詳しくは健康増進課までお問い合わせください。 </div>	
	初回 6日～28日までの間隔をおいて2回	(2回)		3歳
	追加 初回終了後おおむね1年後に1回	(1回)		4歳
	2期: 9歳～13歳未満	1回		9歳
注1) 子宮頸がん 予防ワクチン	中学1年生～高校1年生に相当する女子 (13歳になる年度の4月1日～16歳になる年度の3月31日)	3回	中学1年生 (平成21年4月2日～平成22年4月1日生まれ)	

注1)平成25年6月から差し控えられていた子宮頸がん予防ワクチン接種の積極的勧奨が再開されました。令和4年度は対象者全員へ個別通知します。また、積極的勧奨の差し控えにより、接種機会を逃した平成9年4月2日～平成18年4月1日生まれの方への接種(キャッチアップ接種)も実施されます。詳細については、市ホームページをご確認ください。