

## 定期予防接種の種類と接種時期

▼BCG・ロタ・B型肝炎・小児用肺炎球菌・5種混合・4種混合・ヒブ・2種混合・麻しん風しん・水痘・日本脳炎・子宮頸がん予防

乳幼児期に受ける予防接種については、生後6週頃に予防接種券・予診票を一括してお送ります。  
2種混合、麻しん風しん2期、日本脳炎2期、子宮頸がん予防ワクチンについては、対象年齢に個別通知します。



※予防接種予診票をお持ちでない方は、母子健康手帳を持参して、健康増進課にお越しください。  
予防接種の接種状況を確認させていただいた後、予診票をお渡します。

予防接種名	対象年齢	接種回数	標準的な接種時期	
BCG	1歳に至るまで	1回	生後5か月～8か月に達するまで	
ロタ	ロタリックス (1価)	生後6週に至った日の翌日から24週に至る日の翌日まで	2回	初回接種: 生後2か月～14週6日後まで 接種間隔は27日以上あける *いずれか同一のワクチンで接種を完了してください。
	ロタテック (5価)	生後6週に至った日の翌日から32週に至る日の翌日まで	3回	
B型肝炎	1歳に至るまで	3回	生後2か月～9か月に至るまで	
	1・2回目: 27日以上の間隔をおいて2回	(2回)		
	3回目: 1回目から139日以上の間隔をおいて1回	(1回)		
小児用肺炎球菌ワクチン	生後2か月～60か月に至るまで	4回	*接種開始月齢により接種回数が異なります。	
	初回	27日以上の間隔をおいて3回	(3回)	接種開始: 生後2か月～7か月に至るまで (生後12か月までに3回完了する)
	追加	生後12か月以降に初回終了後、60日以上おいて1回	(1回)	生後12か月～15か月に至るまで
5種混合 ※1 ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ ヒブ	1期 : 生後2か月～90か月に至るまで	4回		
	初回	20日～56日までの間隔をおいて3回	(3回)	生後2か月～7か月に達するまで
	追加	初回終了後6か月以上おいて1回	(1回)	初回終了後6か月～18か月までの間隔をおく
4種混合 ※1 ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ	1期 : 生後2か月～90か月に至るまで	4回		
	初回	20日～56日までの間隔をおいて3回	(3回)	生後2か月～12か月に達するまで
	追加	初回終了後6か月以上おいて1回	(1回)	初回終了後12か月～18か月までの間隔をおく
ヒブワクチン ※1	生後2か月～60か月に至るまで	4回	*接種開始月齢により接種回数が異なります。	
	初回	27日～56日までの間隔をおいて3回	(3回)	接種開始: 生後2か月～7か月に至るまで (生後12か月までに3回完了する)
	追加	初回終了後、7か月～13か月の間に1回	(1回)	
2種混合 ジフテリア 破傷風	2期 : 11歳～13歳未満	1回	小学6年生 (平成24年4月2日～平成25年4月1日生まれ)	
麻しん風しん	1期 : 生後12か月～24か月に至るまで	1回	1歳	
	2期 : 5歳～7歳未満 (小学校就学前の1年間)	1回	年長児 (平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれ)	
水痘	生後12か月～36か月に至るまで	2回	初回: 生後12か月～15か月に至るまで 追加: 初回終了後6か月～12か月に至るまで	
日本脳炎	1期 : 生後36か月～90か月に至るまで	3回		
	初回	6日～28日までの間隔をおいて2回	(2回)	3歳
	追加	初回終了後おおむね1年後に1回	(1回)	4歳
	2期 : 9歳～13歳未満	1回	9歳	
※2 子宮頸がん 予防ワクチン	中学1年生～高校1年生に相当する女子 (13歳になる年度の4月1日～16歳になる年度の3月31日)	3回	中学1年生 (平成23年4月2日～平成24年4月1日生まれ)	
子宮頸がん 予防ワクチン ※2 キャッチアップ 接種	積極的勧奨の差し控えにより、接種機会を逃した 平成9年4月2日～平成20年4月1日生まれの女性	未接種分	令和7年3月31日までの制度です。	

日本脳炎予防接種の積極的勧奨の差し控えにより、接種機会を逃した方につきましては、不足分を特例措置として接種できます。詳しくは健康増進課までお問い合わせください。

※1 5種混合(4種混合、ヒブ)は原則として同じ種類のワクチンを接種してください。すでに、4種混合、ヒブを接種している方は、同じワクチンで完了してください。

※2 2価、4価、9価ワクチンがあります。原則として同じ種類のワクチンを接種することをお勧めしますが、医師とご相談のうえ、9価ワクチンに変更(交互接種)することも可能です。